



Item 204 (ex item 200)

Toux chez l'adulte

Rang	Rubrique	Intitulé	Descriptif
A	Contenu multimédia	Exemples caractéristiques de radio thoracique	Dilatations des bronches, pneumopathie interstitielle, corps étranger
A	Définition	Définition de la toux aiguë et chronique chez l'adulte	
A	Diagnostic positif	Toux aiguë de l'adulte : principales hypothèses diagnostiques	Intégrer le Pas à Pas toux fébrile enfant
A	Diagnostic positif	Toux chronique de l'adulte : principales hypothèses diagnostiques	Pas à Pas Toux chronique
A	Diagnostic positif	Connaitre la sémiologie d'une toux et les signes associés à la toux	
B	Éléments physiopathologiques	Mécanisme du réflexe de toux	Récepteurs, description du réflexe, origine de la toux chronique
A	Examens complémentaires	Connaitre l'indication des examens d'imagerie devant une toux de l'adulte	Connaitre l'indication des examens d'imagerie devant une toux de l'adulte
A	Identifier une urgence	Rechercher les signes de gravité devant une toux aiguë ou chronique	
A	Prise en charge	Traitement symptomatique de la toux	
B	Prise en charge	Éléments de prise en charge étiologique	

Les objectifs de rang B apparaissent en *italique* dans le texte

Points clés

1. La toux aiguë est définie par une durée < 3 semaines.
La toux chronique est définie par une durée >8 semaines.
2. La toux aiguë isolée est dans la très grande majorité des cas secondaires à des infections respiratoires hautes d'origine virale et ne nécessite pas d'exploration.
3. La toux chronique, même isolée, nécessite une prise en charge progressive
4. Dans la toux chronique, avant tout examen complémentaire, une évaluation des caractéristiques de la toux et du profil du patient sont nécessaires pour orienter la conduite à tenir
5. En présence de signes de gravité, une prise en charge spécifique de la cause est nécessaire. L'apparition ou la modification de la toux chez un gros fumeur doit faire évoquer un cancer bronchique.
6. Une radiographie de thorax et une spirométrie sont systématiques dans le bilan de toux chronique.
7. Les principales causes de toux chronique à radiographie de thorax normale chez le non-fumeur sont :
 - Le syndrome de toux d'origine des voies aériennes supérieures (écoulement ou rhinorrhée postérieur chronique dû à une rhino-sinusite chronique)
 - Le reflux gastro-œsophagien
 - L'asthme
 - Les médicaments
8. En 1^{ère} intention, devant une radiographie de thorax normale, il est nécessaire de rechercher les causes fréquentes de toux. En présence d'arguments en faveur d'une de ces causes, un traitement empirique est mis en place
9. Le traitement d'une toux chronique doit être avant tout étiologique
10. Le tabagisme doit être déconseillé et une aide au sevrage définitif doit être apportée dans tous les cas

I DEFINITION

I.1 Définition de la toux

Expulsion brusque et sonore de l'air contenu dans les poumons.

C'est un réflexe mis en jeu pour aider à l'extériorisation des sécrétions bronchiques, trachéales et laryngées ou pour répondre à toute irritation des voies aériennes.

Rôle bénéfique de protection des voies aériennes.

Le diagnostic de toux ne pose pas de problème même s'il existe parfois une confusion avec le hémhage (raclement de gorge).

I.2 Définition de la toux aigue et chronique chez l'adulte

- Toux aigue = toux dont la durée est < 3 semaines
- Toux chronique = toux dont la durée est > 8 semaines
- La toux subaiguë est > 3 semaines et < 8 semaines.

Toux aigue : le plus souvent secondaire aux infections respiratoires hautes d'origine virale et s'améliore spontanément en l'espace de 3 semaines.

Toux chronique : toux qui va nécessiter une prise en charge spécifique car elle ne s'améliorera pas spontanément. Les durées choisies ont pour but de séparer ces 2 entités.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

Le réflexe de toux est présenté Figure 1

Il existe 2 types de neurorécepteurs sensoriels à la toux dans les voies respiratoires hautes et basses :

- *les nocicepteurs qui détectent les irritants chimiques. Les nocicepteurs tels que les récepteurs aux fibres C sont retrouvés dans le larynx, la trachée, les bronches et les parois alvéolaires et sont associés aux fibres C non myélinisées conduisant lentement l'influx nerveux*
- *les mécanorécepteurs sont sensibles aux stimuli mécaniques. Certains tels que les récepteurs d'adaptation rapide (RARs) se trouvent dans le larynx, la trachée et les bronches proximales et transmettent des signaux conduits le long des fibres myélinisées (A δ) à vitesse rapide*

Les voies afférentes des récepteurs des voies aériennes convergent via le nerf vague jusqu'au noyau solitaire (nucleus tractus solitari) situé dans le tronc cérébral. Le noyau solitaire est connecté aux neurones respiratoires situés dans les centres respiratoires qui coordonnent la réponse efférente de la toux jusqu'aux muscles respiratoires, au larynx et aux bronches.

La toux peut également être contrôlée par le cortex cérébral et il existe une commande volontaire pour inhiber ou activer la toux.




Figure 1 : Mécanisme physiopathologique de la toux

III. TOUX AIGUE (TOUX < 3 SEMAINES)

III.1. Adulte

III.1.1 Etiologies

Lorsqu'elle est isolée, la toux est très majoritairement secondaire à des infections respiratoires hautes d'origine virale et s'améliore spontanément. Quand elle s'accompagne d'autres symptômes, la toux peut s'intégrer dans différents tableaux cliniques (Tableau 1).

Tableau 1 : causes principales de toux aiguës chez l'adulte
Infections respiratoires hautes+++ (rhinopharyngite aiguë)
Infections respiratoires basses (bronchite aiguë, plus rarement pneumonie)
Asthme
BPCO
Rhino-sinusite aiguë
RGO
Insuffisance cardiaque gauche (rare)
Embolie pulmonaire (rare)
Pneumothorax et pleurésies (rare)

III.1.2 Diagnostic

Interrogatoire sur les caractéristiques de la toux (symptômes associés, horaires, circonstances déclenchantes...) et le profil du patient (mode de vie, antécédents personnels et familiaux, traitements...)

Examen clinique minutieux avec :

- Inspection des fosses nasales, des conduits auditifs et de la cavité buccale impérative à la recherche de toute anomalie
- Auscultation cardio-pulmonaire obligatoire

Dans la très grande majorité des cas, la toux aiguë ne nécessite pas d'exploration complémentaire.

Une radiographie de thorax est à réaliser en cas d'examen physique anormal notamment de bruits anormaux à l'auscultation (crépitants...).

D'autres examens peuvent se discuter en cas de suspicion de pathologie sous-jacente autre qu'une infection respiratoire haute ou qu'une bronchite virale.

III.1.3 Traitement

En dehors d'infections bactériennes avérées, une antibiothérapie n'apporte aucun bénéfice pour le traitement de la toux aiguë.

Il n'y a pas lieu de prescrire un traitement anti-tussif.

Les traitements anti-tussifs (tableau 2) ou les expectorants ont un rapport bénéfice/risque faible. Les preuves scientifiques de leur efficacité restent à démontrer et les effets secondaires sont parfois importants.

Si le patient est fumeur, c'est toujours une occasion de rappeler la nocivité de la cigarette et de conseiller l'arrêt définitif du tabac.

Il est, quoi qu'il en soit, important d'organiser un suivi à 4-6 semaines afin de s'assurer de la disparition de la toux.

Tableau 2 : Médicaments anti-tussifs
Action centrale : <ul style="list-style-type: none">- Opiacés narcotiques : codéine, pholcodine- Opiacés non narcotiques : dextrométorphane, noscapine- Anti-histaminiques : aliménazine, prométazine- Non opiacé, non anti-histaminiques : oxéladine, pentoxyverine, clobutinol
Action périphérique : <ul style="list-style-type: none">- chlorhydrate d'amyléine, l'aconitine, le benzoate de Na⁺

IV. TOUX CHRONIQUE (TOUX > 8 SEMAINES)

IV.1 Examen clinique et bilan initial

L'interrogatoire est primordial pour bien caractériser la toux et le profil du patient. Les éléments sont :

- **Durée** pour s'assurer qu'il s'agisse bien d'une toux chronique
- Recherche d'une intoxication tabagique
- **Sèche ou productive**. Une toux productive oriente vers une BPCO ou une dilatation des bronches, une toux sèche vers un asthme ou une fibrose.
- **Diurne ou nocturne**. Une toux nocturne oriente vers un asthme ou un RGO, une toux uniquement diurne oriente vers une toux par excès de sensibilité (cf infra) ou une toux psychogène
- **Facteurs déclenchants** (odeurs, position, parfum, spray, changement de température, rire, parole)
- **Signes associés** : pyrosis orientant vers un RGO, jetage / écoulement / rhinorrhée postérieure orientant vers une rhinosinusite chronique (aussi appelé syndrome de toux d'origine des voies aériennes supérieures (STOVAS))
- **Traitements** entrepris dans le passé et leur efficacité
- **Complications** (Tableau 3) : dominées par le handicap social important lié au fait que les patients ne peuvent plus se rendre dans des lieux publics ou chez des proches à cause de ce symptôme bruyant. Un retentissement psychologique est également présent et la toux ne doit jamais être négligée par le médecin même en l'absence de pathologies graves

Tableau 3 : complications de la toux chronique	
Physiques :	<ul style="list-style-type: none">• Troubles du sommeil (toux nocturne)• Fatigue• Céphalées• Fractures de côtes• Hernie inguinale• Reflux gastro-œsophagien• Vomissements• Incontinence urinaire+++ (2/3 des femmes)
Sociales+++	
Psychologiques+++ :	<ul style="list-style-type: none">• Dépression• Anxiété

Un examen physique minutieux avec une auscultation cardio-pulmonaire est indispensable notamment à la recherche de crépitations secs pouvant orienter vers une pneumonie interstitielle diffuse.

Une radiographie de thorax et une spirométrie sont systématiques dans un contexte de toux chronique.

Pas d'indication à faire de scanner thoracique dans un contexte d'examen clinique normal, de radiographie de thorax normale et d'absence de facteurs de risque de cancer bronchique.

IV.2 Etiologies

Les étiologies de la toux chronique de l'adulte se décomposent en causes fréquentes à rechercher en 1^{ère} intention et en causes plus rares à rechercher en 2^e intention (Tableau 4).

Tableau 4 : Etiologies des toux chroniques de l'adulte	
Toux primitives	Syndrome de toux par excès de sensibilité
Toux secondaires	Etiologies fréquentes : <ul style="list-style-type: none">- Syndrome de toux des voies aériennes supérieures (atteintes rhino-sinusiennes)- Asthme- Reflux gastro-oesophagien acide ou non-acide- Médicaments (inhibiteurs de l'enzyme de conversion, gliptine)- Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)- Bronchite à éosinophiles non-asthmatique Etiologies moins fréquentes : <ul style="list-style-type: none">- Fibrose pulmonaire idiopathique- Pneumonie interstitielle diffuse- Sarcoïdose- Cancer bronchique- Dilatation des bronches- Syndrome d'apnée du sommeil- Causes cardiaques (insuffisance cardiaque gauche)- Causes neurologiques, troubles de la déglutition- Toux psychogène

IV.3 Stratégie de prise en charge (Figures 2 et 3)

1. Rechercher les éléments **d'orientation diagnostiques** ou des signes de **gravité** (Tableau 5). En cas de suspicion de cancer bronchique, un scanner thoracique doit être pratiqué.

Tableau 5 : signes de gravité de la toux
<ul style="list-style-type: none">- Altération de l'état général,- Dyspnée d'effort,- Hémoptysie,- Syndrome infectieux,- Apparition ou modification de la toux chez un fumeur,- Dysphonie, dysphagie, fausses routes,- Adénopathie(s) cervicale(s) suspecte(s),- Anomalies de l'examen clinique cardiopulmonaire.

En présence de signes de gravité de la toux, des examens complémentaires s'imposent d'emblée en plus des EFR et de la radiographie du thorax.

Toute suspicion de cancer bronchique doit conduire à la réalisation d'un scanner thoracique.

2. Rechercher et traiter les complications
3. Evaluer objectivement la sévérité de la toux avec une échelle visuelle analogique (EVA) comme dans la douleur.
4. Faire arrêter les traitements tussigènes (IEC, sartans, gliptines) ainsi que le tabac également pendant 4 semaines. On prévient le fumeur qu'il existe une période réfractaire


variable selon les individus avec possiblement une aggravation transitoire de la toux à l'arrêt du tabac.

- Définir les caractéristiques cliniques de la toux et rechercher une cause fréquente de toux (Asthme, RGO, STOVAS). En présence d'arguments pour une pathologie fréquente et compatible, un traitement spécifique est mis en place.
- Si persistance de la toux malgré une prise en charge adaptée ou absence de causes évidentes de toux, des explorations complémentaires de la radiographie thoracique et de la spirométrie sont alors nécessaires en fonction du profil de la toux. Aucun examen n'est systématique et leur réalisation dépend du contexte clinique et des caractéristiques de la toux. Il est difficile ici de détailler l'ensemble de la prise en charge. Le tableau 6 présente des situations fréquentes de toux chronique.

Toux post-prandiale	Avis gastro-entérologique, pHmétrie des 24h, manométrie oesophagienne
Toux en présence de signes de RGO sans efficacité des IPP	Avis gastro-entérologique, pHmétrie des 24h, manométrie oesophagienne
Toux productive sans efficacité des traitements inhalés	Avis pneumologique, TDM thoracique, ECBC, endoscopie bronchique
Toux avec symptômes rhino-sinusiens sans efficacité des traitements topiques	Avis ORL avec nasofibroscopie, tomodensitométrie des sinus


- Si à l'issue de cette prise en charge, aucune cause n'est retrouvée ou aucun traitement n'a amélioré les causes potentielles de toux, on parle alors de toux chronique réfractaire ou inexpliquée (TOCRI).

Figure 2 : arbre décisionnel en présence d'éléments d'orientation diagnostique



TVO : trouble ventilatoire obstructif ; HRB : hyperréactivité bronchique ; IVG : insuffisance ventriculaire gauche ; RGO : reflux gastro-oesophagien ; BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.

Figure 3 : arbre décisionnel en l'absence d'éléments d'orientation diagnostique



IV.4 Traitements

Le traitement symptomatique de la toux chronique a peu de place en pratique et on privilégie la recherche du ou des facteur(s) étiologique(s).

Les traitements anti-tussifs (tableau 2) sont rarement utilisés.

IV.4.1 Prise en charge thérapeutique des étiologies fréquentes (tableau 7)

Tableau 7 : prise en charge thérapeutique des étiologies fréquentes de toux	
Rhinosinusite chronique ou STOVAS	Lavage du nez, corticothérapie nasale, éviction facteurs favorisants, éducation thérapeutique
Asthme	CSI ± BDLA, éviction facteurs favorisants, éducation thérapeutique
RGO	IPP pour au moins 8 semaines, règles hygiéno-diététiques+++

*CSI : corticostéroïdes inhalés, BDLA : bronchodilatateur de longue durée d'action, IPP : inhibiteur de pompe à protons

IV.4.2 Prise en charge thérapeutique des TOCRI

Les TOCRI posent de réels problèmes diagnostiques et thérapeutiques et sont source d'impasse pour les patients et les médecins.

Afin d'expliquer les TOCRI, le concept du syndrome de toux par excès de sensibilité a été introduit récemment. Il existerait une activation du réflexe de toux liée à une sensibilité augmentée des voies neurologiques de la toux. La toux est alors déclenchée pour des stimuli peu tussigènes (hypertussie) ou un déclenchement de la toux pour des stimuli non-tussigènes (allotussie). La physiopathologie serait similaire à celle de la douleur neuropathique. Sur le plan clinique le diagnostic est fait sur l'interrogatoire (Tableau 8).

Tableau 8 : Caractéristiques de la toux par excès de sensibilité
1. Irritation des voies aériennes supérieures (larynx, pharynx), paresthésies voies aériennes supérieures
2. Toux déclenchée par des stimuli non tussigène (allotussie) : parole, rire
3. Augmentation de la sensibilité de la toux à des stimuli inhalés (hypertussie)
4. Toux paroxystique difficile à contrôler
5. Eléments déclencheurs : <ul style="list-style-type: none">- Chant, parole, rire, respiration profonde : activation mécanique- Changement de température, air froid : thermoactivation- Aérosols, parfum, odeurs : chimioactivation- Décubitus dorsal- Repas- Exercice

Les traitements reposent sur les anti-épileptiques (prégabaline ou gabapentine) et la morphine à faible dose.